

Ruta para abortar

De la decisión a la acción
¡Aborto ya!

An illustration of several women's profiles in profile, facing right, overlapping each other. The profiles are rendered in various colors including purple, blue, orange, and green, representing diversity. The women have different hairstyles and features, such as a headscarf, a large earring, and a ponytail.

Botiquín
con menjurjes que
sostienen

Paso 1

Toma la pastilla de mifepristona de 24 a 36 horas antes de ingerir el misoprostol, es mejor si este proceso lo haces en las primeras horas de la mañana, durante este día no experimentarás ningún síntoma.

Esta pastilla se encarga de ablandar y soltar el saco gestacional.

El misoprostol puede dar reacciones como: diarrea, fiebre, vómito y escalofríos.




Paso 2

Pasadas las 24 horas de la ingesta de mifepristona, coloca 4 pastillas de misoprostol en la boca, 2 pastillas en cada lado entre la mejilla y la encía inferior durante 30 minutos hasta que se disuelva.


Pasado el tiempo ingiere el resto de pastillas con agua.

Las pastillas deben ponerse al mismo tiempo.



¿Qué puedes en el transcurso del día?

Un sangrado con flujo de normal a ligeramente abundante hasta llegar a la expulsión del producto, no te preocupes si no baja inmediatamente, este proceso puede durar hasta 48 horas una vez terminada la ingesta de los medicamentos.




En caso de dolor podrás ingerir una pastilla de ibuprofeno cada 6 hrs.

Este proceso puede durar hasta 2 días.

Paso 3

15 días después de la expulsión debes realizarte una ecografía o prueba de embarazo de control. Para corroborar que el procedimiento haya concluido.



Si en algún momento tienes temperatura superior a 38°, si ves borroso, te sientes débil o si realizas cambios de toallas empapadas más de dos veces en menos de media hora; acude al hospital de manera inmediata acompañada de una persona de confianza.



CONSORCIO
◆ OAXACA ◆

TRABAJANDO POR UNA VIDA
EN LIBERTAD PARA
LAS MUJERES